

























Revégénéralisation des berges Shoreline revegetation

2011 COLLECTION 2011

























| | Noms /Name <i>latin, français, English</i> | Hauteur, largeur et besoins Height, width and needs | Caractéristiques /Characteristics |
|----|---|---|--|
| 1 |  <i>Amelanchier canadensis</i> Amelanchier du canada Shadlow serviceberry | ↑ 4 - 7 m ↔ 4 - 6 m  | Fruits comestibles Eatable berries Floraison printanière Spring flowering |
| 2 |  <i>Aronia melanocarpa</i> Aronie noire Black Chokeberry | ↑ 2 m ↔ 1,5 m  | Fruits comestibles Eatable berries Floraison printanière Spring flowering |
| 3 |  <i>Cornus stolonifera</i> Cornouiller stolonifère Red-osier Dogwood | ↑ 2 m ↔ 5 m  | Bon enracinement Good root system Croissance rapide Fast growing |
| 4 |  <i>Diervilla lonicera</i> Diéreville chèvrefeuille Bush Honeysuckle | ↑ 1 m ↔ 1 m  | Rustique Hardy Sol sablonneux et drainé Sandy and dry soil |
| 5 |  <i>Ilex verticillata</i> Houx verticillé Winterberry | ↑ 2 à 3 m ↔ 2 à 3 m  | Attire les oiseaux Bird attractive Fruits persistants l'hiver Berries all winter long |
| 6 |  <i>Iris versicolor</i> Iris versicolore Larger blue flag | ↑ 1 m ↔ 0,4 m  | Bon enracinement Good root system Emblème du Québec Quebec emblem |
| 7 |  <i>Kalmia angustifolia</i> Kalmia à feuilles étroites Sheep Laurel | ↑ 1 m ↔ 1 m  | Sol acide, tourbeux Acidic, peaty soil Floraison printanière Spring flowering |
| 8 |  <i>Myrica gale</i> Myrique baumier Sweet gale | ↑ 1 m ↔ 2 m  | Proximité de l'eau Close to lake Résistant aux glaces Ice action resistant |
| 9 |  <i>Parthenocissus quinquefolia</i> Vigne vierge Virginia creeper | ↑ 4 - 15 m ↔ 1 m  | Bouturage facile Easy reproduction Recouvrement de murets Cover stone walls |
| 10 |  <i>Physocarpus opulifolius</i> Physocarpe à feuilles d'obier Nine-bark | ↑ 1,5 - 3 m ↔ 2 - 3 m  | Sol sablonneux Sandy soil or other Croissance rapide Fast growing |
| 11 |  <i>Potentilla fruticosa</i> Potentille frutescente Shrubby Cinquefoil | ↑ 0,3 - 1 m ↔ 1 - 2 m  | Ignorée des cerfs Not eaten by deer Sol sablonneux Sandy soil or other |
| 12 |  <i>Rosa rugosa</i> Rosier rugueux Wild rose | ↑ 1 - 2 m ↔ 1 - 2 m  | Rustique Hardy Sol sablonneux Sandy soil or other |

Revégénéralisation des berges Shoreline revegetation

2011 COLLECTION 2011



Pépinière
Nature-Vallée
Une division de la / A division of
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau

| | Noms /Name latin, français, English | Hauteur, largeur et besoins Height, width and needs | Caractéristiques /Characteristics | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 13 |  <i>Rubus odoratus</i> Ronce odorante Flowering Raspberry | ↑ 1,5 - 2 m ↔ 1,5 - 2 m |  | Fruits comestibles Eatable berries | Nombreuses fleurs Many flowers |
| 14 |  <i>Salix interior</i> Saule de l'intérieur Sand-bar willow | ↑ 1 - 6 m ↔ 2 - 3 m |  | Bon enracinement Good root system | Résistant aux glaces Ice action resistant |
| 15 |  <i>Salix purpurea</i> "Gracilis" Saule arctique nain Purple basket willow | ↑ 1,5 m ↔ 2 m |  | Bon enracinement Good root system | Résistant aux glaces Ice action resistant |
| 16 |  <i>Sambucus canadensis</i> Sureau du Canada Canadian Elder | ↑ 1,5 - 4 m ↔ 2 m |  | Ignorée des cerfs Not eaten by deer | Croissance rapide Fast growing |
| 17 |  <i>Spiraea latifolia</i> Spirée à larges feuilles Large-leaved Meadow-sweet | ↑ 0,6 - 1,5 m ↔ 0,6 - 1,5 m |  | Ignorée des cerfs Not eaten by deer | Longue floraison estivale Long flowering season |
| 18 |  <i>Spiraea tomentosa</i> Spirée tomenteuse Tomentose Meadow-sweet | ↑ 1,5 m ↔ 1,5 m |  | Ignorée des cerfs Not eaten by deer | Floraison printanière Spring flowering |
| 19 |  <i>Viburnum cassinoides</i> Viorne cassinoïde Appalachian tea | ↑ 1,5 - 2 m ↔ 1 à 3 m |  | Sols acides Acidic soil | Capte le phosphore Phosphorus retention |
| 20 |  <i>Viburnum trilobum</i> Viorne trilobée Cranberry-tree | ↑ 2,5 - 5 m ↔ 2 à 4 m |  | Fruits comestibles Eatable berries | Attire les oiseaux Bird attractive |
| 21 |  <i>Vitis riparia</i> Vigne des rivages Wild grape | ↑ 1,5 - 6 m ↔ 1 m |  | Fruits comestibles Eatable berries | Recouvrement de murets Cover stone walls |
| 22 |  <i>Acer rubrum</i> Érable rouge Red maple | ↑ 9 - 20 m ↔ 15 à 22 m |  | Rustique Hardy | Capte le phosphore Phosphorus retention |
| 23 |  <i>Betula alleghaniensis</i> Bouleau jaune Yellow birch | ↑ 15 - 22 m ↔ 10 à 15 m |  | Sols riches Like rich soil | Capte le phosphore Phosphorus retention |
| 24 |  <i>Prunus virginiana</i> Cerisier de Virginie Choke cherry | ↑ 6 - 10 m ↔ 6 - 10 m |  | Croissance rapide Easy growth | Capte le phosphore Phosphorus retention |